



TU HOGAR LIBRE DE PLAGAS

CONTROL DE PLAGAS EN EL HOGAR



PREVENCIÓN DE RIESGOS

Modificación del Hábitat

Todos los roedores dependen de alimento y refugio para sobrevivir, por lo tanto, eliminar uno o los dos elementos les obligará a abandonar el área. En todas las circunstancias se debe considerar la posibilidad de adoptar medidas para modificar el hábitat como una forma de control.

PASO 1. Casa limpia y seca

Mantenga la vegetación, la madera de chimenea, y otros escombros lejos del exterior de su hogar para que las plagas no puedan subir y entrar.

Limpie lo que derrame inmediatamente con agua y jabón. Saque la basura a diario y cerciórese de que quede la tapa bien cerrada, además mantenga los desagües limpios de residuos de comida.

Mantenga las frutas en el refrigerador.

Lave los platos a diario, o al menos sumérgalos en agua con jabón hasta que los pueda lavar.

Asegúrese de que todos los contenedores y envases de comida y bebidas fuera del refrigerador o el congelador estén bien sellados o cerrados.

Barra o aspire los pisos regularmente.

Mantenga las áreas del baño y la cocina lo mas secas posibles.

Arregle los grifos con goteras y no deje agua acumularse.

Si tiene una mascota, cepíllela seguido con un peine para pulgas y lave su cama frecuentemente. Asegúrese de aspirar los pisos, las alfombras y los sillones con los que su mascota tiene contacto regularmente.

Durante la noche no deje comida a su mascota pues suele ser una tentación para los roedores.

Recomendaciones

Mantener la vivienda ventilada e higienizada, especialmente en cocinas, baños, reposteros, bodegas.

Los residuos domésticos deben ser guardados e recipientes con tapa. Conservar los alimentos en envases en envases con tapa, recipientes bien herméticos o en lugares cerrados.

Use un sellador de silicona para sellar los orificios y grietas por donde las cucarachas puedan ingresar a la vivienda o esconderse

PASO 2. Selle las entradas

Utilice silicona para sellar grietas y espacios en las tablas del piso, los marcos, estantes, tuberías, ductos, lavaplatos, inodoros y enchufes.

Ponga mallas frente a las salidas de los ductos de aire, y repare los hoyos en todas las mallas existentes. ¡Un ratón de hogar promedio puede pasar por un hueco del tamaño de una moneda de diez pesos

Niéguale el acceso a nuevos invasores asegurándose de que los puntos de entrada potenciales estén sellados.



BienValp
BIENESTAR SOCIAL VALPARAÍSO



Medidas Complementarias

- Adecuada gestión de las basuras. Los desechos alimentarios inadecuadamente tratados resultan accesibles a roedores e insectos y son la causa principal de problemas.
- Las basuras se depositarán en los contenedores normalizados y en las localizaciones previstas al efecto.
- Es importante recordar que los residuos deben ubicarse en un contenedor adecuado y siempre tapado y cerrado.
- Contenedores y depósitos deben ser objeto de limpieza regular.



Recomendaciones mordedura Araña de Rincón

Mantener normas de aseo, higiene y orden en todos los recintos, detrás y debajo de los muebles, rincones, parte posterior de los cuadros, detrás del lavaplatos y artefactos de baño. Aspirar prolijamente en forma periódica.

Separar camas de muros para evitar que al bajar las arañas lo hagan por ellas.

No colgar ropa ni toallas en los muros o puertas. Revisar y sacudir ropa y zapatos antes de ponérselos.

Revisar la cama y los rincones antes de acostarse.

Evitar que los niños jueguen a la escondida al interior de closet o cajas que no hayan sido previamente revisadas por adultos responsables.

Al ingresar a un recinto oscuro, sucio o que haya permanecido cerrado por mucho tiempo, hágalo con precaución, iluminando y provocando ruido para dar tiempo a las arañas para que se alejen de usted.

Recomendaciones para evitar las cucarachas

Su alimentación es de lo más variada, consumen alimentos de todo tipo, incluso desperdicios. Son de hábitos nocturnos, lo cual hace que su presencia pueda pasar inadvertida en la vivienda.

Por la forma y tamaño del cuerpo pueden pasar por debajo de puertas y hendiduras se refugian en zócalos, grietas, detrás de muebles, etc. Preferentemente lo hacen en cocinas y otros lugares donde preparan o almacenan alimentos.

Producen secreciones olorosas que afectan el sabor de los alimentos, también microorganismos como bacterias que producen enfermedades.



BienValp
BIENESTAR SOCIAL VALPARAÍSO

Recomendaciones frente a la aparición de murciélagos

Debido a su importancia y a las amenazas que posee, las especies de murciélagos de nuestro país se encuentran protegidos por la Ley de Caza N°4.601, modificada en 1996, que prohíbe su caza o captura. Teniendo en consideración que la presencia de colonias en edificaciones se debe principalmente a deficiencias de construcción y /o mantenimiento, se recomienda que los propietarios/as, así como las empresas constructoras y los municipios, tomen las medidas necesarias para evitar el ingreso de murciélagos a inmuebles e impedir el establecimiento de colonias en ellas.



¿Qué hacer?

El ingreso de murciélagos a las viviendas se considera potencialmente peligroso, por lo que se debe dar aviso solo para conocimiento al Alcalde de la respectiva población naval y éste informará al Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos del BIENVALP.

Se debe procurar tomarlo, evitando el contacto directo con el animal. Para esto, se recomienda utilizar guantes de látex y a su vez reforzar con guante de cabritilla grueso, un recipiente de boca ancha (tupperware plástico), una caja de cartón gruesa, una caja de plumavit o en su efecto un recipiente de tarro de leche.

Así, al momento de encontrar al murciélago posado en una superficie lisa, se debe poner sobre el animal el tarro boca abajo, para posteriormente deslizar un cartón que sirva como tapa, que debe ser fijado con cinta adhesiva reforzada. Además se deberá considerar 3 orificios pequeños que permitan la ventilación del animal capturado al momento de ser entregado en la respectiva SEREMI.

SEREMI SALUD VIÑA DEL MAR Calle Quinta #231, Viña del Mar. / +569 8154899.

SEREMI SALUD VALPARAISO Calle Blanco #1514, Valparaíso. / +569 84068490.

Importante

Si el ejemplar fue detectado dentro de la vivienda en horas en que los moradores se encontraban durmiendo, todo el grupo familiar deberá recibir la primera dosis de la vacuna contra la rabia a la espera de los resultados de los análisis efectuados al ejemplar, si este resulta positivo se deberá completar la dosis antirrábica, todo esto ya que no es posible confirmar al 100% que no hubo contacto con el animal infectado.

Mantener al día la vacunación de las mascotas, en especial la vacuna contra la rabia. En el caso de que la mascota sea quien capturó el murciélago, deberá consultar al veterinario y de ser necesario aplicar una dosis de refuerzo contra la rabia. Evalué su vivienda a fin de detectar posibles colonias de murciélagos.



BienValp
BIENESTAR SOCIAL VALPARAÍSO

Influenza Aviar

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves silvestres y domésticas, causada principalmente por virus tipo A, siendo la cepa H5N1 una de las más relevantes. Aunque su contagio a humanos es raro, puede provocar enfermedades respiratorias graves. Actualmente, se mantiene bajo vigilancia y control en diversas regiones de Chile debido a casos confirmados en aves silvestres. EL principal factor de riesgo es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas. 3.- No se produce por transmisión alimentaria. Existe seguridad de consumo de carne de aves, huevos o subproductos avícolas adquiridos en comercio formal.

Puntos clave y medidas de seguridad



- **Transmisión:** Se produce por contacto directo con aves enfermas o superficies contaminadas (heces, plumas).
- **Síntomas en aves:** Aves silvestres y de corral pueden mostrar comportamiento errático, dificultad respiratoria, diarrea y muerte rápida
- **Acción ciudadana:** No tocar aves muertas o enfermas. Ante un hallazgo, se debe dar aviso inmediato al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Regional o en su oficina más cercana.
- **Prevención:** Mantener aves de corral confinadas, evitar el contacto con aves silvestres y asegurar agua y alimentos limpios.

DIRECSAN remitió las instrucciones ministeriales de vigilancia epidemiológica y medidas de prevención, reforzando la capacidad de detección y notificación inmediata al SEREMI correspondiente, en los casos de infecciones respiratorias graves. La información se encuentra publicada en intranet sanidad naval/departamento de salud/vigilancia epidemiológica.

Instrucciones

1.- Avisar de inmediato a servicio agrícola ganadero (SAG) regional, la existencia o el avistamiento de aves muertas o enfermas, evitando su manipulación.

2.- Considerar que los signos y síntomas de la influenza aviar, pueden comenzar en un plazo de 2 a 7 días desde la infección, en la mayoría de los casos se asemejan a los de influenza convencional: tos, fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza y falta de aire.

3.- Al presentar los síntomas descritos en EL PUNTO 2 anterior, y haber manipulado aves contaminadas, viajado a lugares con casos de influenza aviar o visitado granja o mercado al aire libre, acudir al centro de salud mas cercano para evaluación. Debido a que se han registrado casos de Influenza Aviar altamente patógena, se solicita en caso de avistamiento o hallazgo de aves muertas o enfermas en algún recinto naval, se debe informar vía mensaje naval al COMGENGUARNAVPRIM, complementando posteriormente si el caso correspondía a positivo o negativo.

